



ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະ II
ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພສະນາ



ການປັບປຸງ
ການລ້ຽງໝູລາດຂອງ
ຊາວກະສິກອນ

ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ



ສາລະບານ

1. ການປັບປຸງການລ້ຽງໝູຂອງຊາວກະສິກອນ.....	4
1.1 ການລ້ຽງໝູຂອງຊາວຊົນນະບົດ.....	4
2. ດ້ານເຕັກນິກການຈັດການ.....	5
3. ການປັບປຸງທາງດ້ານ ອາຫານ.....	7
5. ດ້ານການນັກສາ ສຸຂະພາບ.....	10

1. ການປັບປຸງການລ້ຽງໝູຂອງຊາວກະສິກອນ



1.1 ການລ້ຽງໝູຂອງຊາວຊົນນະບົດ

ໝູພື້ນເມືອງເປັນສັດລ້ຽງທີ່ຢູ່ກັບຊາວກະສິກອນລາວເຮົາມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ຊຶ່ງທ່າແຮງຂອງໝູພື້ນເມືອງແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມລ້ຽງແບບເປັນຟາມຂະ ໜາດນ້ອຍໃນລະບົບການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເພາະວ່າຈຸດດີຂອງ ໝູພື້ນເມືອງ ແມ່ນ ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວເຮົາ ໄດ້ດີ ແລະ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ອາຫານຄຸນນະພາບຕ່ຳທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ດີ, ຊຶ່ງສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໝູລາດແມ່ນ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໄດ້ ດີກວ່າໝູພື້ນຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ແມ່ນມີ ຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກຊີ້ນໝູພື້ນເມືອງ ຫລາຍ ກວ່າໝູພື້ນ ແລະ ທ່າແຮງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດພາຍນອກຈາກຕ່າງປະເທດກໍຍັງມີທິດທາງ



ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາຖືກ ແມ່ນຢາ ເມບັນ ດາໂຊນ, ຟາຣມິນ, ປີເປີວອມ ທີ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາປິວ ສັດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ. ສິ່ງສໍາຄັນໃນການຂ້າແມ່ທ້ອງ ແມ່ນຕ້ອງ ໃຫ້ສັດກິນຢາໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມນໍ້າໜັກໝູ.

ຢາເມເບນດາໂຊນ 1 ເມັດປະມານ 500 ມິລິກຣາມ, ຊຶ່ງພຽງພໍສໍາ ລັບໝູນ້ອຍທີ່ມີນໍ້າໜັກໂຕເຖິງ 25 ກິໂລກຣາມ. ສ່ວນໝູແມ່ພັນທີ່ມີນໍ້າໜັກ ຫລາຍອາດຕ້ອງໃຊ້ຢາປະມານ 3-4 ເມັດ. ໃນບາງຄັ້ງມີການນໍາໃຊ້ຢາ ໄອ ໂວເມັກຕິນ ສໍາລັບການຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ໝູ ເພາະວ່າມັນສາມາດຂ້າແມ່ທ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ການສັກຢາໄອໂວເມັກຕິນ ແມ່ນຕ້ອງສັກ ລືບໜັງໃນອັດຕາ 1 ມິລິລິດ/10 ກິໂລ ນໍ້າໜັກໝູ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວນກວດເບິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຢູ່ໃນສະຕິກເກີຂອງແກ້ວ ຢາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2014
ລຽບລຽງໂດຍ:

ດຣ. ຈອນຈິດ ດວງພະຈັນ

າຍ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນ
ຫລຸດຜ່ອນທັງການແຜ່
ການຕາຍຂອງໝູ



ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ລະບາດ ແລະ
ລົງອີກດ້ວຍ.

ຕາຕະລາງໃນການນໍາໃຊ້
ໝູ

ຢາວັກຊີນສໍາລັບ

ທີ່ຈະສູງຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໝູພື້ນເມືອງແບບ
ເປັນຟາມຂະໜາດນ້ອຍ ໃນລະບົບການລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນສໍາເລັດ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

2. ດ້ານເຕັກນິກການຈັດການ .

ການຫັນປ່ຽນລະບົບການລ້ຽງແບບປ່ອຍມາເປັນການລ້ຽງແບບຂັງ
ຄອກ ຫລື ຂັງບໍລິເວນແມ່ນເປັນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງການລ້ຽງໝູ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຈັດການດີຂຶ້ນ, ຫລຸດຜ່ອນ



ຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດ, ຫລືກລ້ຽງການປະສົມພັນໃນສາຍເລືອດດຽວ
ກັນ, ໄດ້ກືນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊຶ່ງ
ທັງໝົດນັ້ນຖືວ່າເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການລ້ຽງໝູຂອງຊາວກະສິກອນໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້.

ການລ້ຽງແບບປ່ອຍຕາມທໍາມະຊາດ

ການຄ້າແມ່ທອງໄຫວ້ເປັນວຽກນັ້ງຫລາຍ ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ສິກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືເບົາ. ການຂ້າແມ່ທອງຈະເຮັດໃຫ້ໝູໄຫວ້ໄວ, ຂະພາບ
ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຕິດແຢລທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບາດອື່ນໆ ກດ້ວຍ.
ການຂ້າແມ່ທອງສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຈະເຮັດກັບໝູນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນໄລຍະກ່ອນເອົາຂຶ້ນຄອກທອມເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໝູນ້ອຍເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າ
ໂຕທີ່ບໍ່ໄດ້ຂ້າແມ່ທອງ, ນອກຈາກນັ້ນ ການຂ້າແມ່ທອງໄຫວ້ແມ່ນ ໃນ
ໄລຍະ 2 ອາທິດກ່ອນຈະເອົາມັນເຂົ້າຄອກຕິດລູກ. ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ການ
ຕິດເຊື້ອແມ່ທອງຂອງໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່ຫລຸດຕໍ່າລົງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໝູນ້ອຍ
ໃຫຍ່ໄວ.





ດັ່ງນັ້ນ, ການລ້ຽງໝູໃຫ້ຖືກຕາມເຕັກນິກຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ
ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກການສ້າງຄອກຕ້ອງໃຫ້ຖືກຈຸດປະສົງຂອງການຜະລິດຄື:
ການສ້າງຄອກເພື່ອລ້ຽງໝູທອມຂາຍ ຫລື ການສ້າງຄອກສໍາລັບການລ້ຽງ
ໝູເພື່ອຜະລິດໝູນ້ອຍຂາຍ.

ການລ້ຽງໝູແບບຂັງໃສ່ຄອກ

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ການສ້າງຮາງອາຫານທີ່ດີກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນການ
ຕົກເຮັຍເສັຍຫາຍໃນເວລາເກືອໝູ, ການຕອບສະໜອງນໍ້າຢ່າງພຽງພໍກໍ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະໝູແມ່ທີ່ກໍາລັງຜະລິດນໍ້ານົມ
ລ້ຽງລູກ.

ການຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ໝູພໍ່ແມ່ພັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກກໍ່
ແມ່ນອີກດ້ານນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງການລ້ຽງໝູ ເພື່ອການຜະລິດໝູ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ການຄັດເລືອກ ແລະ
ນໍາໃຊ້ໝູພໍ່ແມ່ພັນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝູເກີດລູກຫລາຍໂຕ ໝູນ້ອຍແຂງແຮງດີ;

ອາດຄອກ ຫລື ສະຖານທີ່ລ້ຽງໝູ, ສ້າງກອງທຶນຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ
ຂອງບ້ານ ແນໃສ່ການເຂົ້າເຖິງຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ຂອງຊາວກະສິ
ກອນ, ຄວາມຮູ້ໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາປ້ອງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມເຕັກນິກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງໝູລົງໄດ້. ໃນກໍ
ລະນີຊື້ ຫລື ນໍາໝູຈາກບ່ອນອື່ນມາລ້ຽງ ຄວນຈະເລືອກຊື້ຈາກບ່ອນທີ່ມີ
ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີພະຍາດເກີດຂຶ້ນ.

ຫລັງຈາກຊື້ມາແລ້ວກໍຕ້ອງແຍກໝູອອກລ້ຽງຢູ່ຄອກສະເພາະ ເຊິ່ງ
ຫ່າງໄກ ຈາກໝູໂຕອື່ນ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງອາການຂອງໝູ 2-4 ອາທິດ
ຖ້າເຫັນວ່າໝູປົກກະຕິ ແຂງ ແຮງດີແລ້ວຈຶ່ງສັກຢາປ້ອງກັນ ແລ້ວນໍາມາ
ລ້ຽງຮ່ວມກັບໝູໂຕອື່ນໄດ້.

ລ/ດ	ຊະນິດ ຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດ	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະ ຄຸ້ມກັນ
1	ອະຫິວາ ໝູ	3 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ	ຢາກ້ອງ 10 ເຂັມປະສົມ ນໍ້າກັນ 10 ຊີຊີ, ສັກ 1 ຊີຊີ/ໂຕ (ສັກກ້າມຊີ້ນ) ຫ້າມສັກຢາກັບໝູຖືພາ	6 ເດືອນ
2	ຫູກໍາ	1 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ	ຢາກ້ອງ 10 ເຂັມ ປະສົມນໍ້າກັນ 10 ຊີຊີ, ສັກ 2 ຊີຊີ/ໂຕ (ສັກກ້າມຊີ້ນ)	6 ເດືອນ
3	ປາກ ເປື່ອຍ ລົງເລັບ	2 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ	ຢາກ້ອງ 20,50,100,150 ຊີຊີ. ສັກ 2 ຊີຊີ/ໂຕ (ສັກກ້າມຊີ້ນ)	12 ເດືອນ

ນອກຈາກການສ້າງຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນແລ້ວ ການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕາມຄາດໝ

ກັບການລ້ຽງໝູນ້ອຍແບບທຳມະຊາດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕພຽງ 20-25 ກຣາມຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ.

ຕົ້ນໝາກຖົ່ວເຫລືອງ ເມັດໃນໝາກຖົ່ວເຫລືອງ
ຕົ້ນຖົ່ວສະຕາຍໂລ

5. ດ້ານການນັກສາສຸຂະພາບ



ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ້ອງກັນພະຍາດ,ເອົາໃຈໃສ່ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍສັດທີ່ເຈັບເປັນພາຍໃນບ້ານ ຫລືມາຈາກເຂດໄກ້ຄຽງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດນັ້ນແມ່ນເປັນປັດໃຈອັນສຳຄັນຕົ້ນຕໍໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ໝູນ້ອຍຕາຍລຸດລົງໃນລະບົບການລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການອູນາໄມ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະ



ຫລືວ່າເຕັກນິກການຢ່ານົມໝູນ້ອຍຈາກແມ່ທີ່ໄວຂຶ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໝູແມ່ກັບມາປະສົມພັນໄວຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຮອບວຽນການຜະລິດໝູໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ການຄັດເລືອກແນວພັນທີ່ດີ

3. ການປັບປຸງທາງດ້ານອາຫານ

ອາຫານທີ່ນຳໃຊ້ລ້ຽງໝູພື້ນເມືອງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ອາຫານທຳມະຊາດທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ມາຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳຊຶ່ງອາຫານເລົ່ານີ້ ສວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານທາດອາຫານຕ່ຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະກອບມີທາດໂປຣຕີນຕ່ຳບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໝູ ເຖິງວ່າໃບພິດຜັກທຳມະຊາດບາງຊະນິດຈະມີທາດໂປຣຕີນສູງ ແຕ່ກໍ່ມີເຍື້ອໄຍສູງ ເວລາກິນເຂົ້າໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍ

ເພື່ອນຳເອົາທາດອາຫານມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຮ່າງກາຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທາງເລືອກໃນການປັບປຸງອາ . ຫານໝູກໍ່ຄືການແນະນຳປູກຖົ່ວອາຫານສັດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວສະໂຕໂລຈື່ງເປັນເຕັກນິກນຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບອາຫານ ຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝູລຸ້ນທີ່ລ້ຽງທອມໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝູລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ແມ່ນ 100 ກຣາມຕໍ່ມື້ ແຕ່ຖ້ານຳໃຊ້ຖົ່ວສະຕາຍໂລເປັນອາຫານເສີມໃນລະດັບ 20% ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຂຶ້ນເປັນ 200-300 ກຣາມຕໍ່ມື້; ຜົນໄດ້ຮັບ



ດັ່ງກ່າວນີ້ຖືວ່າມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ຕໍ່ເຕັກນິກການປັບປຸງອາຫານໝູໂດຍໂດຍນຳໃຊ້ຖົ່ວສະຕາຍໂລເພື່ອເປັນອາຫານໝູຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

ລຳບອນ ຫລື ລຳເຜືອກ ອາຫານໝູພື້ນບ້ານ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄຸ່ງຄູ່ກັບຈຸດດີຂອງ ຖົ່ວສະໂຕໂລກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນບາງດ້ານເພາະວ່າຖົ່ວສະໂຕໂລມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ຊຶ່ງຈະປົ່ງຂຶ້ນໄວຫລັງຈາກການຕັດ ຖ້າຕັດຖົ່ວອາຍຸເກີນ 30 ວັນຂຶ້ນໄປເຮັດໃຫ້ຖົ່ວມີເຍື້ອໄຍສູງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນອາຫານສຳລັບໝູນ້ອຍຢ່ານົມທີ່ມີນ້ຳໜັກໂຕຕໍ່າກວ່າ 20 ກິໂລກະຣາມ. ໃນການປັບປຸງອາຫານໝູນ້ອຍຢ່ານົມຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຊຶ່ງການນຳໃຊ້



ຖົ່ວເຫລືອງຈື່ງແມ່ນອີກເຕັກນິກນຶ່ງໃນການປັບປຸງອາຫານໝູນ້ອຍຢ່ານົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຖົ່ວເຫລືອງເປັນອາຫານໃນລະດັບ 20% ຂອງ



ອາຫານໝູນ້ອຍມີການເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງ 120-150 ກຣາມຕໍ່ມື້ ຖ້າສົມທຽບ